

Digitales Brandenburg

hosted by Universitätsbibliothek Potsdam

Otis

Berlin, 1993

Literatur

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-4473

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ALTENKAMP, R. (2004): Die Bestandssituation des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Brandenburg und Berlin im Jahr 2000 und die Bestandsentwicklung seit 1986. Otis 12: 107-112.
- BAER, W. (1907): Die Brutplätze des Kranichs in Deutschland. Ornithol. Mschr. 32: 229-234, 271-275.
- ARNOLD, I. & K. KUHLMANN (1993): Über einige Zusammenhänge zwischen Braunkohlenförderung und Wasserhaushalt in der Niederlausitz. Natur Landschaft Niederlaus. 14: 3-16.
- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Liste der Vögel Deutschlands. Limicola 19: 89-111.
- BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Wiebelsheim.
- BERNARDY, P., K. DZIEWIATY, I. PEWSDORF & M. VON HAAREN (2009): Integratives Schutzkonzept zum Erhalt ackerbrütender Vogelgemeinschaften im hannoverschen Wendland. In: BERNARDY, P. (2009): Ökologie und Schutz des Ortolans (*Emberiza hortulana*) in Europa. Natursch. Landschaftspf. Nieders. 45, 173 S.
- BESCHOW, R. (2002): Zum Vorkommen der Türkentaube, *Streptopelia decaocto*, im Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus im Jahr 2001. Natur Landsch. Niederlaus. 22: 38-49.
- BESCHOW, R. (2003): Baumbrütende Mauersegler *Apus apus* in der Stadt Spremberg - Ergebnisse einer Bestandserfassung 2003. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 21: 47-55.
- BESCHOW, R. (2005): Erfolgreich bebrütete Mischgelege von Mandarinente (*Aix galericulata*) und Schellente (*Bucephala clangula*) in der zentralen Niederlausitz. Otis 13: 45-52.
- BESCHOW, R. (2007): Zum Vorkommen des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) im SPA-Gebiet Lausitzer Bergbaufolgelandschaft – Teilgebiet Welzow-Süd – Ergebnisse eines 12-jährigen Monitoringprogramms. Otis 15: 19-32.
- BLOCK, B. (2000): 16 Jahre Untersuchung an der Waldohreule (*Asio otus*) im Landkreis Havelland – Brutbestand und Reproduktion in einem Untersuchungsgebiet von 50 km². Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 9: 57-61.
- BLOCK, B. (2009): Long-term trends in population density and reproductive success of Long-eared Owl *Asio otus* in Brandenburg, Germany. Ardea 97: 111-115.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1986): Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Flachland und zu ersten Brutnachweisen im Bezirk Potsdam. Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artensch. 2: 30-35.
- BOA (2008): Berliner Brutvogelbericht 2007. Berl. ornithol. Ber. 18: 118-132.
- BOA (2009): Berliner Brutvogelbericht 2008. Berl. ornithol. Ber. 19: 101-116.
- BOA (2010): Berliner Brutvogelbericht 2009. Berl. ornithol. Ber. 20: 123-138.
- BOCK, C. (2000): Erfassung wiesenbrütender Limikolen im NSG Große Grabenniederung und im NSG Havelländisches Luch im Frühjahr 2000 - Abschlußbericht. unveröff.
- BÖHNER, J. & T. LANGGEMACH (2004): Warum kommt es auf jeden einzelnen Schreiadler *Aquila pomarina* in Brandenburg an? Ergebnisse einer Populationsmodellierung. Vogelwelt 125: 271-281.
- BRUCH, A., H. ELVERS, C. POHL, D. WESTPHAL & K. WITT (1978): Die Vögel in Berlin (West). Eine Übersicht. Ornithol. Ber. Berlin (West) 3: Sonderheft.
- CREUTZ, G. (1970): Das Vorkommen des Schwarzstorches (*Ciconia nigra* L.) in Brandenburg. Beitr. Tierwelt Mark 6: 20-30.
- DEGEN, G. & W. OTTO (1988): Atlas der Brutvögel von Berlin. Naturschutzarb. Berlin Brandenb., Beiheft 8: 1-56.
- DENKER, E., A. BÜTHE, H. KNÜWER, T. LANGGEMACH, P. LEPOM & I. RÜHLING (2001): Vergleich der Schadstoffbelastung in Eiern des Sperbers (*Accipiter nisus*) aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Deutschland. J. Ornithol. 142: 49-62.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. Limicola 22: 249-338.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. Limicola 23: 257-333.
- DEUTSCHMANN, H. (1994): Erste Brut des Singschwans (*Cygnus cygnus*) in Brandenburg. Otis 2: 161-164.
- DEUTSCHMANN, H. (1997): Der Singschwan *Cygnus cygnus* als neuer deutscher Brutvogel. Limicola 11: 76-81.
- DEUTSCHMANN, H. & T. SPITZ (2009): Vorkommen und Lebensraum des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Brandenburg. Otis 17: 69-84.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1980): Die Kolbenente (*Netta rufina*) Brutvogel in der Mark Brandenburg. Ornithol. Mitt. 32: 64-65.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1982): Die Moorente (*Aythya nyroca* Güld.) – Brutvogel im NSG Felchowsee (Kreis Angermünde). Naturschutzarb. Berlin Brandenb. 18: 61-65.
- DITTBERNER, H., W. DITTBERNER & J. SADLIK (1979): Karmingimpel als Brutvogel in der Mark Brandenburg. Falke 26: 296-298.
- DITTBERNER, W. (1996): Die Vogelwelt der Uckermark. Galenbeck.
- DITTBERNER, W. (2005): Das Feuchtgebiet internationaler Bedeutung Unteres Odertal – eine ökologische Brutfalle? Otis 13, Sonderheft: 9-18.

- DITTBERNER, W. (2007): Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) und Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) brüten 2006 im unteren Odertal. Otis 13: 3-14.
- DITTBERNER, W. (2009): Die Knäkente *Anas querquedula* im unteren Odertal. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 8: 56-64.
- DOHLE, W. & U. KRAATZ (2009): Auf dem Weg zum Wildnisgebiet – Eine Kartierung der Brutvögel im Polder Friedrichsthal (Unteres Odertal) 13 Jahre nach der Erklärung zum Totalreservat durch das Nationalparkgesetz 1995. Milu 12: 531-586.
- DURR, T. (2009): Zur Gefährdung des Rotmilans *Milvus milvus* durch Windenergieanlagen in Deutschland. Inform. d. Natursch. Niedersachs. 29, 3: 185-191.
- DURR, T. & T. LANGGEMACH (2006): Greifvögel als Opfer von Windkraftanlagen. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten 5: 483-490.
- DURR, T., W. MÄDLow, T. RYSLAVY & G. SOHNS (1997): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 6, Beilage.
- ECKSTEIN, K. (1909): Das Tier. in: Landeskunde der Provinz Brandenburg. I. Bd. Berlin.
- ELVERS, H. (1982): Rote Liste der gefährdeten Brutvögel von Berlin (West). Landschaftsentw. Umweltforsch. 11: 169-184.
- FALKENBERG, M., J. BÖHNER, S. SALINGER, W. SCHULZ, H. STREHLOW, K. WITT & U. TIGGES (2004): Mauersegler (*Apus apus*) in Berlin: Lebensraumtypische Dichten und Bestand 2002. Berliner ornithol. Ber. 14: 166-185.
- FISCHER, S. (2003): Der Brutbestand der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in Brandenburg - Ergebnisse der Erfassung 2001. Otis 11: 51-58.
- FISCHER, S., W. OTTO & B. SCHONERT (1991): Zum Auftreten einiger seltener Vogelarten in Berlin (Ost). Pica 18: 191-221.
- FIUCZYNSKI, K. D., V. HASTÄDT & P. SÖMMER (2009a): Der Baumfalke (*Falco subbuteo*) im Berliner Raum: Populationsentwicklung, Reproduktion, Habitatveränderung und Schutzmaßnahmen. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten 6: 95-108.
- FIUCZYNSKI, K. D., V. HASTÄDT, S. HEROLD, G. LOHMANN & P. SÖMMER (2009b): Vom Feldgehölz zum Hochspannungsmast – neue Habitate des Baumfalken (*Falco subbuteo*) in Brandenburg. Otis 17: 51-58.
- FLADE, M. (2007): Die Deutsche Agrarlandschaft im Spiegel ornithologischer Forschung. Vogelwarte 45: 265-267.
- FLATH, R. (2003): Baumbrütende Mauersegler (*Apus apus*) in der Schorfheide. Otis 11: 47-50.
- GATTER, W. (2000): Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. Wiebelsheim.
- GEIGER, F., J. BENGTTSSON, F. BERENDSE, W. WEISSER, M. EMMERSON, M. MORALES, P. CERYGNIER, J. LIIRA, T. TSCHARNTKE, C. WINQUIST, S. EGGERS, R. BOMMARCO, T. PÄRT, V. BRETAGNOLLE, M. PLANTAGENESTA, L. CLEMENT, C. DENNIS, C. PALMER, J. ONATE, I. GUERRERO, V. HAWRO, T. AAVIK, C. THIES, A. FLOHRE, S. HÄNKE, C. FISCHER, P. GOEDHARDT & P. INCHAUSTI (2010): Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. Basic Appl. Ecol. 11: 97-105.
- GIERACH, K.-D. (2008): Die Wiesenweihe in der nordwestlichen Niederlausitz 2003-2007. Biol. Stud. Luckau 37: 70-84.
- GRUBER, D. (1995): Die Kennzeichen und das Vorkommen der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* in Europa. Limicola 9: 121-165.
- HAASE, P. & T. RYSLAVY (1997): Brutvorkommen der Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) in Westbrandenburg 1997. Otis 5: 97-102.
- HAUFF, P. (1998): Bestandsentwicklung des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Deutschland seit 1980 mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre. Vogelwelt 119: 47-63.
- HAUPT, H. (1977): Beobachtungen über das Vorkommen von Limikolen im Teichgebiet Peitz und seiner Umgebung in den Jahren 1969 bis 1975. Naturschutzarb. Berlin Brandenb. 13: 18-28.
- HAUPT, H. (1983): Die Bedeutung des Teichgebietes Peitz als Brut-, Mauser- und Zwischenrastplatz für Wasservögel. Naturschutzarb. Berlin Brandenb. 19: 9-18.
- HAUPT, H. & R. KAMINSKI (1995): Sind Silbermöwen und Weißkopfmöwen eigene Arten? Falke 41: 68-73.
- HAUPT, H., W. MÄDLow & U. TAMMLER (2004): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2002. Otis 12: 1-46.
- HAUPT, H., W. MÄDLow & U. TAMMLER (2008): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2005. Otis 16: 1-52.
- HEINISCH, E. (1992): Umweltbelastung in Ostdeutschland. Darmstadt.
- HEISE, G. (1970): Zum Brutvorkommen des Seggenrohrsängers, *Acrocephalus paludicola* (Vieillot), im Norden der DDR. Beitr. Tierwelt Mark 6: 77-88.
- KALBE, L. & J.-J. SEEGER (1972): Das Vorkommen der Uferschnepfe, *Limosa limosa*, in Brandenburg. Beitr. Tierwelt Mark 9: 95-117.
- KALBE, L. (1990): Der Gänsesäger. Wittenberg.
- KAMIENIARZ, R. (1995): Changes in the range and population of the Black Grouse (*Tetrao tetrix*) in The Lower Slesian Coniferous Forests from 1982-94 and a proposal for active protection of this species. Przegląd Przyrodniczy VI: 185-196.
- KIRMSE, W. (1994): Der Wanderfalke in Brandenburg – Rückblick und Ausblick. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 3: 33-36.

- KIRSCHHEY, T. (2007): Brutnachweis des Grauspechts im Naturschutzgebiet Stechlin. Ostprignitz-Ruppiner Jahrb. 2007: 232-234.
- KISSLING, D. (2001): Siedlungsdichte des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* und GIS-gestützte Bestandsabschätzung im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Vogelwelt 122: 1-14.
- KLAFFS, G. & J. STÜBS (1987): Die Vogelwelt Mecklenburgs. Jena.
- KOLBE, E. (1972): Die Entenvögel der Welt. Radebeul.
- KÖRNER, M. (2004): Brutbestand und Habitatwahl des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Brandenburg im Jahr 2001. Otis 12: 71-80.
- KNEIS, P., T. GÄRTNER & H. LUX (2007): Zwergseeschwalben (*Sternula albifrons*) wieder an der oberen Mittelelbe. Acta ornithocol. 6: 115-119.
- KRÜGER, H.-P. (1971): Beobachtungen an Enten und Gänsen im Teichgebiet von Peitz. Beitr. Tierwelt Mark 8: 41-57.
- KRÜGER, S. (1987): Die Enten der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 61/6: 1-16.
- KUBE, J. (1988): Zum Limikolendurchzug im unteren Odertal (1976-1986). Beitr. Vogelkd. 34: 177-193.
- LANDGRAF, L. (2009): Moore im Land Brandenburg. Beitr. Biosphärenres. Flusslandschaft Elbe Brandenburg 9/2009: 10-16.
- LANGGEMACH, T. (2001): Vogelotod durch Bindegarn in der Landwirtschaft. Falke 48: 148-151.
- LANGGEMACH, T. (2004): Die Wiederbesiedlung Brandenburgs durch den Uhu (*Bubo bubo*) im Lichte nahrungskundlicher Untersuchungen. Otis 12: 53-70.
- LANGGEMACH, T. (2009): Aktuelles aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg. Otis 17: 113-118.
- LANGGEMACH, T. (2010): Aktuelles aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg. Otis 18: 125-130.
- LANGGEMACH, T. & T. RYSLAVY (2010): Vogelarten der Agrarlandschaft in Brandenburg – Überblick über Bestand und Bestandstrends. Naturschutz u. Biologische Vielfalt XX: 99-122.
- LANGGEMACH, T. & P. SÖMMER (1996): Zur Situation und zum Schutz der Adlerarten in Brandenburg. Otis 4: 78-146.
- LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, W. KIRMSE, C. SAAR & G. KLEINSTÄUBER (1997): Erste Baumbrut des Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Brandenburg zwanzig Jahre nach dem Aussterben der Baumbrüterpopulation. Vogelwelt 118: 79-94.
- LAUBAG (1993): Hydrogeologische Komplexstudie – Niederlausitzer Braunkohlenrevier. Senftenberg.
- LEIPE, T. (1987): Nochmals zu: „Brutnachweis der Rostgans“. Falke 34: 56-57.
- LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1966): Der Brutbestand der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) in Brandenburg. Beitr. Tierwelt Mark 8: 159-177.
- LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1991): Vorkommen, Biologie und Schutz der Trauerseeschwalbe im Bezirk Potsdam. Chlidonias 1: 9-16.
- LÖSCHAU, M. & J. RATHGEBER (2003): Erster Brutnachweis der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) in Brandenburg. Otis 11: 96-98.
- LUDWIG, B. & G. LINDE (1969): Bartmeisen, *Panurus biarmicus*, südlich von Berlin. Beitr. Vogelkd. 14: 436-446.
- LUDWIG, B. (2008): Die Bestandsentwicklung des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Bundesland Brandenburg in den Jahren 1964-2005 – Ergebnisse einer 41jährigen kontinuierlichen Erfassung. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (2008): 3. Jubiläumsband Weißstorch. Loburg.
- LUTZ, E. (1939): Die Entwicklung der Trappenbestände in der Mark Brandenburg. Deutsche Jagd 34: 517.
- MÄDLow, W. & B. RUDOLPH (2008): Das Brutvorkommen der Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Brandenburg 2004. Otis 16: 65-76.
- MÄDLow, W. & T. RYSLAVY (2009): Das Vorkommen der Nilgans *Alopochen aegyptiaca* in Brandenburg und Berlin bis 2008. Ornithol. Mitt. 61: 167-174.
- MAIERHOFER, J. (2009): Ergebnisse des Brutvogelmonitorings im Rückdeichgebiet bei Lenzen 2008 innerhalb des Naturschutzgroßprojektes Lenzener Elbtalaue - Kurzbericht. unveröff.
- MAKATSCHEW, W. (1966): Die Avifauna der Umgebung von Brandenburg/Havel. Vogelwelt 87: 53-57.
- MAKATSCHEW, W. (1981): Verzeichnis der Vögel der DDR. Leipzig, Radebeul.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (2005): Zur Lage der Greifvögel und Eulen in Deutschland 1999-2002. Vogelwelt 126: 53-65.
- MEYBURG, B.-U., T. BELKA, Š. DANKO, J. WÓJCIAK, G. HEISE, T. BLOHM & H. MATTHES (2005): Geschlechtsreife, Ansiedlungsentfernung, Alter und Todesursachen beim Schreiadler (*Aquila pomarina*). Limicola 19: 153-179.
- MEYBURG, B.-U., K. GRASZYNSKI, T. LANGGEMACH, P. SÖMMER & U. BERGMANIS (2008): Cainism, nestling management in Germany in 2004-2007 and satellite tracking of juveniles in the Lesser Spotted Eagle (*Aquila pomarina*). Slovak Raptor J. 2: 53-72.
- MEYBURG, B.-U. & C. MEYBURG (2009): Todesursachen von Schreiadlern. Falke 56: 382-388.
- MLUR (2000): Artenschutzprogramm Birkhuhn. Potsdam.
- MÖCKEL, R. (2005): Auerhuhn (*Tetrao urogallus*) in Brandenburg ausgestorben. Otis 13: 67-70.
- MÖCKEL, R., F. BROZIO & H. KRAUT (1999): Auerhuhn und Landschaftswandel im Flachland der Lausitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8, Sonderheft 1.
- MÖCKEL, R. & K. ILLIG (1997): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) – ein neuer Brutvogel in der Niederlausitz. Biol. Stud. Luckau 26: 64-66.

- MÖCKEL, R. & H. MICHAELIS (1999): Möwen und Seeschwalben der Lausitzer Bergbaugewässer in Gefahr! *Seevögel* 20: 71-78.
- MÖNIG, R. & H. HORN (1998): Ornithologische Bestandserhebungen auf einer Rieselfeldfläche südwestlich von Berlin. *Acta ornithoecol.* 4: 65-71.
- MÜLLER, E. (1968): Schwarzkehlchen brütet bei Finsterwalde/NL. *Falke* 15: 391.
- NICKEL, L. (1985): Brutnachweis der Rostgans im Kreis Fürstenwalde. *Falke* 32: 280-281.
- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Jena.
- NOACK, H.-H. (1962): Brutnachweis des Schwarzkehlchens im Landkreis Brandenburg. *Falke* 9: 30-31.
- NOACK, J. & F. NOACK (1991): Zur Bestandssituation von Eisvogel und Gebirgsstelze im Kreis Pritzwalk 1991. *Ornithol. Mitt. Prignitz* 4: 6-7.
- NOAH, T. (2000): Siedlungsdichte, Habitat und Bestandsentwicklung der Spechte im NSG „Innerer Unterspreewald“. *Otis* 8: 75-98.
- NOAH, T. (2002): Zweitbrut und Polygynie beim Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*. *Limicola* 16: 70-84.
- NOAH, T. (2007): Überraschende Erkenntnisse vom Singschwan (*Cygnus cygnus*) im Spreewald – ein Brutnachweis aus dem Jahr 1990. *Otis* 15: 15-18.
- OEHLSCHLAEGGER, S. & T. RYSLAVY (1998): Bestand und Habitatnutzung des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*, L. 1758) auf Truppenübungsplätzen bei Jüterbog. *Otis* 6: 122-137.
- OEHLSCHLAEGGER, S. & T. RYSLAVY (2002): Brutbiologie des Wiedehopfes (*Upupa epops*) auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Jüterbog, Brandenburg. *Vogelwelt* 123: 171-188.
- OEHME, G. (1987): Zum Phänomen der Eidünnschaligkeit allgemein sowie am Beispiel des Seeadlers, *Haliaeetus albicilla* (L.), in der DDR. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten* 1: 159-170.
- OTTO, W. (2007): Brutbestand der Haubenlerche (*Galerida cristata*) 2004/2005 in Berlin. *Berl. ornithol. Ber.* 17: 1-13.
- OTTO, W. (2010): Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) als Brutvogel auf dem Berliner Stadtgebiet. *Berl. ornithol. Ber.* 20: 30-49.
- OTTO, W. & K. WITT (2002): Verbreitung und Bestand Berliner Brutvögel. *Berl. ornithol. Ber.* 12, Sonderheft.
- PASSARGE, H. (1987): Wandel in Anatiden-Beständen um Eberswalde (1980:1985). *Beitr. Vogelkd.* 33: 341-342.
- PAWLOWSKI, H. (1994): Eine Brut des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) im Gebiet Fürstenwalde. *Otis* 2: 157-160.
- RECKIN, L. (1979): Eine Brut des Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes*, am Rande Berlins. *Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum* 4: 87-93.
- REUSSE, P., M. WALTER, H. LUX, P. KNEIS (2001): Bruten der Moorente (*Aythya nyroca*) in zwei Teichgebieten an der unteren Röder in Südbrandenburg und in Nordsachsen in den Jahren 1999 und 2000. *Acta ornithoecol.* 4: 405-409.
- RHEINWALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands – Kartierung um 1985. DDA-Schriftenreihe 12.
- ROBEL, D. (1991): Die bisher letzte Brut der Blauracke *Coracias garrulus* in Deutschland – gescheitert. *Vogelwelt* 112: 148-149.
- ROBEL, D. & T. RYSLAVY (1996): Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Wiedehopfes (*Upupa epops*) in Brandenburg. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 5 (4): 15-23
- RUHLE, D. (1988): Atlasprogramm „Kartierung der Brutvögel der DDR 1978 - 1982“, Ergebnisse des Bezirkes Cottbus. *Niederlaus. Ornithol. Mitt.* 1.
- RUHLE, D. (1990): Kartierung der Brutvögel der DDR 1978-82, Ergebnisse des Bezirkes Cottbus – Fortsetzung. *Niederlaus. Ornithol. Mitt.* 2.
- RUTSCHKE, E. (1983): Die Vogelwelt Brandenburgs. Jena.
- RUTSCHKE, E. & D. KNUTH (1977a): Zur Brutverbreitung der Reiherente (*Aythya fuligula*). *Potsd. Forsch., R. B* 9: 53-64.
- RUTSCHKE, E. & D. KNUTH (1977b): Die Brutverbreitung der Moorente (*Aythya nyroca*) in der DDR. *Potsd. Forsch., R. B* 9: 65-70.
- RYSLAVY, T. (2002): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2000. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 11: 183-197.
- RYSLAVY, T. (2007): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2005. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 16: 75-85.
- RYSLAVY, T. (2009a): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2006. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 18: 4-13.
- RYSLAVY, T. (2009b): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2007. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 18: 143-153.
- RYSLAVY, T. (2011): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 2008. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 20: 49-62.
- RYSLAVY, T. & M. JURKE (2007): Das „Monitoring häufiger Brutvogelarten in der Normallandschaft“ in Brandenburg – die neue Methode Linienkartierung. *Otis* 15: 79-91.
- RYSLAVY, T. & W. MADLOW (2008): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008. *Natursch. Landschaftspf. Brandenb.* 17, Beilage.

- RYSLAVY & M. PUTZE (2000): Zum Schwarzstorch (*Ciconia nigra* [L., 1758]) in Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 9: 88-96.
- SADLIK, J. (2005): Untersuchungen am Wachtelkönig (*Crex crex*) im Nationalpark Unteres Odertal. Otis 13, Sonderheft: 49-56.
- SCHAFFER, S. & P. POLLESCHNER (1986): Brutnachweise des Schwarzkehlchens für die Niederlausitz. Natur Landsch. Bez. Cottbus 8: 81-82.
- SCHALOW, H. (1919): Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.
- SCHMIDT, M. & W. MADLOW (2006): Die Ausbreitung der Mandarinente (*Aix galericulata*) im Berliner Raum. Berl. ornithol. Ber. 16: 22-28.
- SCHOLZ, E. (1962): Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. Potsdam.
- SCHÖPS, A. (1995): Zur Siedlungsdichte wiesenbrütender Singvögel in Abhängigkeit von der Flächennutzung. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 4 (2): 17-22.
- SCHWEDE, G. (1983): Beobachtungen zur Kolbenente (*Netta rufina*) im Teichgebiet Linum, Kreis Neuruppin. Beitr. Tierwelt Mark 8: 83-85.
- SEEGER, J.-J. (1974): Untersuchungen zum Brutbestand der Limicolen im Bereich der unteren Havel. Beitr. Vogelkd. 20: 421-426.
- SEEGER, J.-J. (1996): Die Bedeutung der Unteren Havelniederung für die Avifauna. Havelreport 1: 40-43.
- SOHNS, G. & H. WAWRZYNIAK (1970): Ein Brutvorkommen der Bartmeise am Rietzer See. Falke 17: 292-298.
- STACKEBRANDT, W., G. EHMKE & V. MANHENKE (1997): Atlas zur Geologie von Brandenburg. Kleinmachnow.
- SÜDBECK, P., H. ANDERTZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
- SÜDBECK, P., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung. Ber. Vogelsch. 44: 23-82.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, M. FLADE, C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, J. SCHWARZ & J. WAHL (2009): Vögel in Deutschland - 2009. Münster.
- TISCHLER, F. (1916): Das Vorkommen der Reiherente (*Nyroca fuligula*) in Deutschland. Ornithol. Mschr. 41: 255-273.
- UHLIG, R., J. MUNDT & J. KALICIUK (1998): Die Bestandssituation der Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons* an der unteren Oder. Limicola 12: 136-142.
- WAWRZYNIAK, H. & G. SOHNS (1977): Der Seggenrohrsänger. Neue Brehm-Bücherei 504. Lutherstadt Wittenberg.
- WAWRZYNIAK, H. & G. SOHNS (1986): Die Bartmeise. Neue Brehm-Bücherei 553. Lutherstadt Wittenberg.
- WESTPHAL, D. (1998): Das Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) auf dem Rieselfeld Karolinenhöhe am westlichen Stadtrand von Berlin. Berl. ornithol. Ber. 8: 3-12.
- WIEGANK, F. (1982): Die Vögel der Seelensdorf-Pritzerber Heide und der angrenzenden Niederungen. Naturschutzarb. Berlin Brandenb., Beiheft 5.
- WILKE, H. (1974): Zwergseeschwalbenbrut in der Niederlausitz. Falke 21: 124-125.
- WITT, K. (1986): Die Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) - 1983 erneut Brutvogel in Berlin. Ornithol. Ber. Berlin (West) 9: 142-144.
- WITT, K. (1999): Neststandorte und Brutbestand der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) in Berlin 1995-1997. Berl. ornithol. Ber. 9: 3-36.
- WITT, K. (2003): Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin, 2. Fassung 17.11.2003. Berl. ornithol. Ber. 13: 173-194.
- WITT, K. (2010): Weiterer dramatischer Rückgang der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) 2009 in Berlin. Berl. ornithol. Ber. 20: 55-61.