

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Beiträge zur fossilen Flora

Atlas von 19 lithographischen Tafeln

Weiss, Christian Ernst

Berlin, 1876

Taf. VII.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11520

Taf. VII.

Fig. 1. *Cingularia typica*, S. 99, Grube Heinitz. — Achre und beblätterter Stengel, s. die Bemerkungen im Text.

Fig. 2. *Cingularia typica (minor)*, S. 101, Grube Heinitz; in Thoneisenstein.

Fig. 3. Desgl., von Grube Heinitz; in Thoneisenstein. — Von unten gesehen, einzelne Ansatznarben der Sporangien scharf.

Fig. 4. Desgl., Grube Dechen, Flötz Adalbert. — Isolirter fertiler Blattwirtel, von oben gesehen.


Fig. 5. Wie vorige, aber von unten gesehen.

Fig. 6 u. 7. *Cingularia typica (minor)*, aus dem Steinbachstolln der Grube v. d. Heydt bei Saarbrücken; mittlere Saarbrücker Schichten. Zugleich Original zu Taf. XIV Fig. 4 in meiner Flora etc. vom Saar-Rheingebiete.

Fig. 8. Desgl., Grube Dechen, Flötz Adalbert. — Isolirter fertiler Wirtel, von unten gesehen; der innere Theil nicht erhalten, 9 Lappenpaare erhalten, das 10te würde die vorhandene Lücke genau ausfüllen. Ansatzstellen der Sporangien deutlich.

Fig. 9. Auf demselben Stück wie Fig. 3. An einzelnen Stellen kommen hinter dem Fruchtwirtel die Zähne der sterilen Scheide hervor, deutlich durch Gestein von dem ersteren geschieden. Da man von den Fruchtwirteln die Unterseite sieht, so ist das Stück verkehrt gezeichnet.

Sämmtliche Stücke im Besitze des Verfassers und von ihm gesammelt.



Gez. v. Lütz.

Lith. v. E. Ohmann.

