

Digitales Brandenburg

hosted by **Universitätsbibliothek Potsdam**

Die devonischen Aviculiden Deutschlands

ein Beitrag zur Systematik und Stammesgeschichte der Zweischaler

Atlas von achtzehn lithographirten Tafeln

Frech, Fritz

Berlin, 1891

Tafel I.

urn:nbn:de:kobv:517-vlib-11587

Tafel I.

Aviculopecten.

(Vergl. Tafel II und XVII.)

Fig. 1—1b.	<i>Aviculopecten aquisgranensis</i> nov. sp. Oberstes Oberdevon (Sandstein mit <i>Spirifer Verneuli</i>). Zwischen Venwegen und Cornelimünster bei Aachen. Fig. 1, 1a Steinkerne, Fig. 1b Abguss der Aussenseite. Geologische Landesanstalt . . .	S. 19
Fig. 2.	<i>Aviculopecten? radiatus</i> GOLDF. sp. Obere Coblenzschichten (untere Bänke). Hohenrheiner Hütte bei Lahstein. Abguss. Naturhistorischer Verein, Bonn. (Vgl. S. 162)	S. 19
Fig. 3.	<i>Aviculopecten (Pterinopecten) Calceolae</i> nov. sp. Untere Calceolaschichten. Loogh ¹⁾ bei Hillesheim, Eifel. Abguss. Berliner Museum	S. 24
Fig. 4.	<i>Aviculopecten (Pterinopecten) mosellanus</i> nov. sp. Obere Coblenzschichten. Laubbach bei Coblenz. Abguss. (Ergänzung nach einem anderen, gleich grossen Exemplar). Naturhistorischer Verein, Bonn	S. 24
Fig. 5.	<i>Aviculopecten (Orbipecten) Hasbachi</i> ARCH. VERN. sp. Mittleres Mitteldevon. Refrath bei Köln. Die Figur stellt das Original A. ROEMER's (Berliner Museum) dar und ist eine Combination aus dem Schalenexemplar und einem Abguss der Gegenplatte	S. 27
Fig. 6	<i>Aviculopecten (Pterinopecten) eifelensis</i> nov. sp. Obere (?Oberste) Coblenzschichten. Prüm i. d. Eifel. Schalenexemplar. Naturhistorischer Verein, Bonn. (Vgl. S. 162)	S. 23
Fig. 7—7b.	<i>Aviculopecten pelmensis</i> nov. sp. Obere Calceolaschichten. Fig. 1, 1a ein kleines Exemplar von Gees bei Gerolstein in natürlicher Grösse und vergrössert. Coll. FRECH. Fig. 7b ein grösseres Exemplar, Gerolstein. Geologische Landesanstalt	S. 15
Fig. 8—8B.	<i>Aviculopecten (Pterinopecten) dauniensis</i> . Untere Coblenzschichten. Ober-Stadtfeld bei Daun. Fig. 8 Abguss der Aussenseite. Fig. 8a Steinkern desselben Exemplars. Fig. 8B Sculptur des Flügels von Fig. 8 vergrössert. Coll. FRECH . .	S. 22
Fig. 9—9b.	<i>Aviculopecten polytrichus</i> PHILL. sp. Unteres Oberdevon. Bergfeld bei Rübeland, Harz. Schalenexemplare. Geologische Landesanstalt	S. 16
Fig. 10.	<i>Aviculopecten Schulzi</i> nov. sp. Abguss der Aussenseite. Oberstes Oberdevon (Sandstein mit <i>Spirifer Verneuli</i>). Stollberg bei Aachen. Geologische Landesanstalt (leg. F. ROEMER)	S. 21
Fig. 11.	<i>Aviculopecten prumiensis</i> nov. sp. Obere Coblenzschichten. Waxweiler bei Prüm. Steinkern. Geologische Landesanstalt	S. 21
Fig. 12.	<i>Aviculopecten (Orbipecten) Follmanni</i> nov. sp. Untere Coblenzschichten. Daaden im Siegenschen. Steinkern mit einem Theile der Ligamentfläche. Coll. FRECH. Vergl. Taf. II, Fig. 8—9a	S. 29


Die Abbildungen sind, wenn nichts anderes bemerkt ist, in natürlicher Grösse gezeichnet.

¹⁾ Auf Seite 25 unten lese man statt *A. looghiensis*: *A. Calceolae*.

Frech, Devonische Aviculiden.

Abhandl. d. geol. Landesanst. Bd. IX, Heft 3.

Taf. I.



E. Gührmann, gez. u. lith.

Druck v. A. Romangé

